Zadanie 4A

$\boxed{c=1}$

(1) Liczba K^+ która przeżyje po czasie $t \simeq \frac{L}{v_K} \approx \frac{L}{c} \simeq 2\cdot 10^{-6}\,s$

$$N = N_0 \exp\left(-\frac{ct}{c\tau\gamma_K}\right)$$

$$\gamma_K = \frac{E_K}{m_K} \simeq 405 \qquad \beta_K = 0.999997 = \frac{\sqrt{E_K^2 - m_K^2}}{E_K}$$

$$N = N_0 \exp\left(-\frac{2\cdot 10^{-6}}{405\cdot 1.24\cdot 10^{-8}}\right) = N_0 \exp(-0.4) = N_0 \cdot 0.67$$

Nie rozpada się więc 67%, a rozpadnie się ~33% K^+.

(2) Rozpad w locie $K^+ \to \mu^+ \nu_\mu$

w układzie K^+ prawo zachowania energii

$$m_K^2 = (E_\mu + E_\nu)^2 - \underbrace{(\vec{p}_{\hat{z}} + \vec{p}_{\hat{z}})^2}_{p_{\hat{z}} - p_{\hat{z}}} = (E_\mu + E_\nu)^2$$

$\hookrightarrow 0$

$\boxed{c=1}$

Czyli $\quad m_K = E_\mu + E_\nu \quad$ lub $\quad (m_K - E_\nu)^2 = E_\mu^2$

$$E_\mu^2 = m_\mu^2 + p^2 = m_\mu^2 + E_\nu^2$$

$$\Downarrow$$

$$m_K^2 - 2m_K E_\nu + \cancel{E_\nu^2} = m_\mu^2 + \cancel{E_\nu^2}$$

$$E_\nu = \frac{m_K^2 - m_\mu^2}{2m_K} = 235.6\ \text{MeV}$$



$$E_\mu = \left(E_\nu^2 + m_\mu^2\right)^{1/2} = 258.4\ \text{MeV} \quad \text{i} \quad p_\mu = E_\nu = p$$

Transformacja do układu LAB żeby obliczyć $E_{\mu^+}^{min}$

$$E_{\mu^+ LAB}^{min} = \gamma_K (E_\mu - E_\nu \beta_K) \approx \gamma_K (E_\mu - E_\nu) =$$

$$\simeq 405\,(258.4 - 235.6)\ \text{MeV} = 9.23\ \text{GeV}$$