

# Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów

## Oddziaływania słabe

Aleksander Filip Żarnecki

Wykład ogólnouniwersytecki



24 listopada 2020

- 1 Oddziaływania podstawowe (przypomnienie)
- 2 Liczby kwantowe
- 3 Neutrina
- 4 Teoria Fermiego
- 5 Model Weinberg'a-Salam'a

- 1 Oddziaływania podstawowe (przypomnienie)
- 2 Liczby kwantowe
- 3 Neutrina
- 4 Teoria Fermiego
- 5 Model Weinberg'a-Salam'a

## Oddziaływanie grawitacyjne    Źródło: masa

Choć jest najsłabsze ze wszystkich znanych oddziaływań, **dominuje na największych odległościach!** Rządzi ewolucją Wszechświata, rotacją galaktyk, ruchami planet, utrzymuje nas na powierzchni Ziemi...

Wszystkie masy przyciągają się (**nie ma "ujemnej" masy**)

⇒ im większy układ tym większe oddziaływanie...

## Oddziaływanie grawitacyjne      Źródło: masa

Choć jest najłabsze ze wszystkich znanych oddziaływań, **dominuje na największych odległościach!** Rządzi ewolucją Wszechświata, rotacją galaktyk, ruchami planet, utrzymuje nas na powierzchni Ziemi...

Wszystkie masy przyciągają się (**nie ma "ujemnej" masy**)

⇒ im większy układ tym większe oddziaływanie...

## Oddziaływania elektromagnetyczne      Źródło: ładunek elektryczny

**Dominuje w naszym życiu codziennym!**

Decydują o mikroskopowej budowie materii: opisują strukturę atomów, wiązania chemiczne, własności fizyczne materiałów.


Oddziaływania makroskopowe (tarcie, siły sprężystości itp.) są na poziomie mikroskopowym oddziaływaniami elektromagnetycznymi.

Ładunki dodatnie i ujemne równoważą się


⇒ im większy układ tym mniej widoczne oddziaływania ładunków...

## Oddziaływania silne Źródło: ładunek kolorowy

Każdy z kwarków obdarzony jest ładunkiem kolorowym:  $R$ ,  $G$  lub  $B$ .




Anty-kwarki mają odpowiednie anty-kolory (kolory "ujemne"):  $\bar{B}$ ,  $\bar{R}$ ,  $\bar{G}$



Jako swobodne mogą istnieć tylko cząstki nie niosące netto ładunku kolorowego (cząstki "białe"):

- bariony (3 kwarki:  $R + G + B$ )
- antybariony (3 antykwarki:  $\bar{R} + \bar{G} + \bar{B}$ )
- mezony (kwark+antykwark, np.  $R + \bar{R}$ )



## Oddziaływania silne      Źródło: ładunek kolorowy

Nośniki oddziaływań silnych, **gluony**, też niosą **ładunek kolorowy** i mogą ze sobą oddziaływać. Prowadzi to do “odwrotnej” zależności sprzężenia od odległości między ładunkami:

- na małych odległościach oddziaływanie jest słabe  
⇒ **asymptotyczna swoboda**
- na dużych odległościach oddziaływanie szybko rośnie  
⇒ **uwięzienie kwarków**

## Oddziaływania silne      Źródło: ładunek kolorowy

Nośniki oddziaływań silnych, **gluony**, też niosą **ładunek kolorowy** i mogą ze sobą oddziaływać. Prowadzi to do “odwrotnej” zależności sprzężenia od odległości między ładunkami:

- na małych odległościach oddziaływanie jest słabe  
⇒ **asymptotyczna swoboda**
- na dużych odległościach oddziaływanie szybko rośnie  
⇒ **uwięzienie kwarków**

Oddziaływania silne spajają kwarki w protony i neutrony.

(oddziaływanie silne kolorowe)



## Oddziaływania silne      Źródło: ładunek kolorowy

Nośniki oddziaływań silnych, **gluony**, też niosą **ładunek kolorowy** i mogą ze sobą oddziaływać. Prowadzi to do “odwrotnej” zależności sprzężenia od odległości między ładunkami:

- na małych odległościach oddziaływanie jest słabe  
⇒ **asymptotyczna swoboda**
- na dużych odległościach oddziaływanie szybko rośnie  
⇒ **uwięzienie kwarków**

Oddziaływania silne spajają kwarki w protony i neutrony.

(oddziaływanie silne kolorowe)

Mimo, że nukleony są “białe” to oddziaływania ich składników powodują efektywne przyciąganie krótkozasięgowe ⇒ powstają jądra atomowe

(oddziaływanie silne jądrowe)

- 1 Oddziaływania podstawowe (przypomnienie)
- 2 Liczby kwantowe**
- 3 Neutrina
- 4 Teoria Fermiego
- 5 Model Weinberg'a-Salam'a

Obserwacje rozpadów cząstek były (i wciąż są) podstawowym źródłem informacji o ich własnościach.

Głównym czynnikiem decydującym o kanałach rozpadu jest **masa cząstki!**

**Najczęściej** powinny zachodzić rozpady, dla których różnica między masą cząstki początkowej i masą produktów rozpadu jest **największa**.

**Im większa różnica mas tym szybciej też powinien zachodzić dany rozpad.**

Obserwacje rozpadów cząstek były (i wciąż są) podstawowym źródłem informacji o ich własnościach.

Głównym czynnikiem decydującym o kanałach rozpadu jest **masa cząstki!**

**Najczęściej** powinny zachodzić rozpady, dla których różnica między masą cząstki początkowej i masą produktów rozpadu jest **największa**.

Im większa różnica mas tym szybciej też powinien zachodzić dany rozpad.

**Ale nie zawsze to działa!** Przy porównywalnych masach: (patrz wykład 2)

$$\Lambda \rightarrow p + \pi^- \quad \tau \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

$$\Delta \rightarrow p + \pi^- \quad \tau \sim 10^{-23} \text{ s}$$

Obserwacje rozpadów cząstek były (i wciąż są) podstawowym źródłem informacji o ich własnościach.

Głównym czynnikiem decydującym o kanałach rozpadu jest **masa cząstki!**

**Najczęściej** powinny zachodzić rozpady, dla których różnica między masą cząstki początkowej i masą produktów rozpadu jest **największa**.

Im większa różnica mas tym szybciej też powinien zachodzić dany rozpad.

**Ale nie zawsze to działa!** Przy porównywalnych masach: (patrz wykład 2)

$$\Lambda \rightarrow p + \pi^- \quad \tau \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{s}$$

$$\Delta \rightarrow p + \pi^- \quad \tau \sim 10^{-23} \text{s}$$

Wiele obserwacji nie zgadzało się z oczekiwaniami.

Zmuszało do zastanowienia:

- dlaczego jedne cząstki rozpadają się szybciej, a inne wolniej?
- dlaczego jedne kanały rozpadu wybierane są częściej niż inne?
- dlaczego niektóre (dostępne energetycznie) rozpady nie zachodzą?

Aby wyjaśnić obserwowane kanały produkcji i rozpadów cząstek, a także mierzone czasy życia, trzeba było założyć, że oprócz **zasad zachowania energii i pędu** obowiązują też inne zasady zachowania związane z **własnościami samych cząstek!**

Aby wyjaśnić obserwowane kanały produkcji i rozpadów cząstek, a także mierzone czasy życia, trzeba było założyć, że oprócz **zasad zachowania energii i pędu** obowiązują też inne zasady zachowania związane z **własnościami samych cząstek!**

## Zachowanie ładunku elektrycznego

Ściśle przestrzegane w przyrodzie.

Dodatkowo ładunek cząstek elementarnych jest skwantowany - występuje tylko jako wielokrotność ładunku elektronu

Aby wyjaśnić obserwowane kanały produkcji i rozpadów cząstek, a także mierzone czasy życia, trzeba było założyć, że oprócz **zasad zachowania energii i pędu** obowiązują też inne zasady zachowania związane z **własnościami samych cząstek!**

## Zachowanie ładunku elektrycznego

Ściśle przestrzegane w przyrodzie.

Dodatkowo ładunek cząstek elementarnych jest skwantowany - występuje tylko jako wielokrotność ładunku elektronu

**Zachowanie liczby barionowej** bariony: cząstki złożone z 3 kwarków  
Zapostulowane w 1938 roku, że wyjaśnić stabilność protonu.

Bariony (p, n,  $\Lambda$ ...):  $B=+1$ , antybariony:  $B=-1$ , pozostałe:  $B=0$ .

Rozpad protonu nie łamie zasad zachowania ładunku ani energii, np.



Ale rozpad taki nie zachowuje liczby barionowej ( $1 \rightarrow 0$ )! **ZABRONIONY!**



Aby wyjaśnić obserwowane kanały produkcji i rozpadów cząstek, a także mierzone czasy życia, trzeba było założyć, że oprócz **zasad zachowania energii i pędu** obowiązują też inne zasady zachowania związane z **własnościami samych cząstek!**

## Zachowanie ładunku elektrycznego

Ściśle przestrzegane w przyrodzie.

Dodatkowo ładunek cząstek elementarnych jest skwantowany - występuje tylko jako wielokrotność ładunku elektronu

## Zachowanie liczby barionowej

bariony: cząstki złożone z 3 kwarków

Zapostulowane w 1938 roku, że wyjaśnić stabilność protonu.

Bariony (p, n,  $\Lambda$ ...):  $B=+1$ , antybariony:  $B=-1$ , pozostałe:  $B=0$ .

Rozpad protonu nie łamie zasad zachowania ładunku ani energii, np.



Ale rozpad taki nie zachowuje liczby barionowej ( $1 \rightarrow 0$ )! **ZABRONIONY!**

Liczba barionowa  $\equiv$  (liczba kwarków - liczba antykwarków)  $\times \frac{1}{3}$

## Zachowanie liczby leptonowej

W wielu procesach elektronowi towarzyszy neutrino (lub antyneutrino), np.



zaś nie występują procesy typu



## Zachowanie liczby leptonowej

W wielu procesach elektronowi towarzyszy neutrino (lub antyneutrino), np.



zaś nie występują procesy typu



Można to wytłumaczyć wprowadzając **elektronową liczbę leptonową**  $L_e$   
 $L_e(e^-) = L_e(\nu_e) = +1$ ,  $L_e(e^+) = L_e(\bar{\nu}_e) = -1$ , pozostałe:  $L_e = 0$

## Zachowanie liczby leptonowej

W wielu procesach elektronowi towarzyszy neutrino (lub antyneutrino), np.



zaś nie występują procesy typu



Można to wytłumaczyć wprowadzając **elektronową liczbę leptonową**  $L_e$   
 $L_e(e^-) = L_e(\nu_e) = +1$ ,  $L_e(e^+) = L_e(\bar{\nu}_e) = -1$ , pozostałe:  $L_e = 0$   
 Suma  $L_e$  w stanie początkowym musi być równa sumie  $L_e$  na końcu.

## Zachowanie liczby leptonowej

W wielu procesach elektronowi towarzyszy neutrino (lub antyneutrino), np.



zaś nie występują procesy typu



Można to wytłumaczyć wprowadzając **elektronową liczbę leptonową**  $L_e$   
 $L_e(e^-) = L_e(\nu_e) = +1$ ,  $L_e(e^+) = L_e(\bar{\nu}_e) = -1$ , pozostałe:  $L_e = 0$   
 Suma  $L_e$  w stanie początkowym musi być równa sumie  $L_e$  na końcu.

Analogicznie do  $L_e$  wprowadzamy **liczbę mionową**  $L_\mu$  i **liczbę taonową**  $L_\tau$ .  
 Całkowita liczba leptonowa:  $L = L_e + L_\mu + L_\tau$  ściśle zachowana !!!

Poszczególne liczby  $L_e$ ,  $L_\mu$ ,  $L_\tau$  zachowane prawie zawsze,  
 odstępstwa zaobserwowano dotychczas tylko przy oscylacjach neutrino...

## Dziwność

Wśród cząstek odkrywanych w latach 30 i 40 XX w. wyróżniała się klasa cząstek o **nieoczekiwanie długich czasach życia**. **Było to “dziwne”...**  
Okazało się też, że cząstki te produkowane są zawsze w parach ?!...

## Dziwność

Wśród cząstek odkrywanych w latach 30 i 40 XX w. wyróżniała się klasa cząstek o nieoczekiwanie długich czasach życia. Było to “dziwne”... Okazało się też, że cząstki te produkowane są zawsze w parach ?!...

Dlatego zapostulowano wprowadzenie nowej liczby kwantowej: **dziwności S**. Dziwność jest zachowana w oddziaływaniach silnych i elektromagnetycznych, dlatego w tych oddziaływaniach cząstki obdarzone dziwnością mogą być tylko produkowane w parach (cząstka + antycząstka).

## Dziwność

Wśród cząstek odkrywanych w latach 30 i 40 XX w. wyróżniała się klasa cząstek o **nieoczekiwanie długich czasach życia**. **Było to "dziwne"...**  
Okazało się też, że cząstki te produkowane są zawsze w parach ?!...

Dlatego zapostulowano wprowadzenie nowej liczby kwantowej: **dziwności S**.  
Dziwność jest **zachowana w oddziaływaniach silnych i elektromagnetycznych**, dlatego w tych oddziaływaniach cząstki obdarzone dziwnością mogą być tylko **produkowane w parach (cząstka + antycząstka)**.

**Gdyby dziwność była ściśle zachowana to cząstki dziwne byłyby stabilne!**

Dziwność **nie jest jednak zachowana w oddziaływaniach słabych**

⇒ cząstki dziwne rozpadają się w wyniku **oddziaływań słabych**

⇒ to tłumaczy dużo **dłuższy czas życia** (w porównaniu do rozpadów "zwykłych" cząstek w oddz. silnych i elektromagnetycznych)



## Dziwność

Wśród cząstek odkrywanych w latach 30 i 40 XX w. wyróżniała się klasa cząstek o **nieoczekiwanie długich czasach życia**. **Było to "dziwne"...**  
Okazało się też, że cząstki te produkowane są zawsze w parach ?!...

Dlatego zapostulowano wprowadzenie nowej liczby kwantowej: **dziwności S**.  
Dziwność jest **zachowana w oddziaływaniach silnych i elektromagnetycznych**, dlatego w tych oddziaływaniach cząstki obdarzone dziwnością mogą być tylko **produkowane w parach (cząstka + antycząstka)**.

**Gdyby dziwność była ściśle zachowana to cząstki dziwne byłyby stabilne!**

Dziwność **nie jest jednak zachowana w oddziaływaniach słabych**  
⇒ cząstki dziwne rozpadają się w wyniku **oddziaływań słabych**  
⇒ to tłumaczy dużo **dłuższy czas życia** (w porównaniu do rozpadów "zwykłych" cząstek w oddz. silnych i elektromagnetycznych)

Dziś wiemy już, że dziwność cząstki odpowiada liczbie kwarków  $s$ ...

- 1 Oddziaływania podstawowe (przypomnienie)
- 2 Liczby kwantowe
- 3 Neutrina**
- 4 Teoria Fermiego
- 5 Model Weinberg'a-Salam'a

## Promieniotwórczość

Odkrycie promieniotwórczości uranu: [Henri Becquerel, 1896.](#)

[1903](#) - nagroda Nobla, wraz z [M.Skłodowską](#) i [P.Curie](#)


## Promieniotwórczość

Odkrycie promieniotwórczości uranu: **Henri Becquerel, 1896.**

**1903** - nagroda Nobla, wraz z **M.Skłodowską i P.Curie**

**E.Rutherford and F.Soddy** opublikowali pracę tłumaczącą promieniotwórczość jako wynik **przemiany pierwiastków**: jeden rodzaj atomu emituje promieniowanie przemieniając się w atom innego pierwiastka.

- promieniowanie  $\alpha$



jądra helu:  $2p2n$

- promieniowanie  $\beta$



elektrony ( $\beta^+$  - pozytony)

- promieniowanie  $\gamma$



wysokoenergetyczne fotony


## Promieniotwórczość

Odkrycie promieniotwórczości uranu: **Henri Becquerel, 1896.**

**1903** - nagroda Nobla, wraz z **M.Skłodowską i P.Curie**

**E.Rutherford and F.Soddy** opublikowali pracę tłumaczącą promieniotwórczość jako wynik **przemiany pierwiastków**: jeden rodzaj atomu emituje promieniowanie przemieniając się w atom innego pierwiastka.

- promieniowanie  $\alpha$



jądra helu:  $2p2n$

- promieniowanie  $\beta$



elektrony ( $\beta^+$  - pozytony)

- promieniowanie  $\gamma$




wysokoenergetyczne fotony

Oczekiwano, że cząstki promieniowania powinny nieść **energię  $E_0$**  odpowiadającą różnicy mas izotopów...

## Rozpady $\alpha$ i $\gamma$

Dyskretne widmo energii:




Energia emitowanej cząstki

$$E_{\alpha} = E_0 \equiv \Delta m c^2$$

## Rozpad $\beta$

Ciągłe widmo energii:



Naruszenie zasady zachowania energii !?

Energia emitowanych elektronów

$$E_{\beta} \leq E_0 \equiv \Delta m c^2$$

## Hipoteza Pauliego

Aby “uratować” zasadę zachowania energii Pauli zaproponował istnienie neutrina: dodatkowej cząstki unoszącej część energii w rozpadzie  $\beta$ :



## Hipoteza Pauliego

Aby “uratować” zasadę zachowania energii Pauli zaproponował istnienie neutrino: dodatkowej cząstki unoszącej część energii w rozpadzie  $\beta$ :



Neutrino nie oddziałuje silnie (nie ma koloru), elektromagnetycznie (nie ma ładunku) ani grawitacyjnie (ma zaniedbywalną masę).

Aby opisać rozpad  $\beta$  (z udziałem neutrino) trzeba wprowadzić nowe, dodatkowe oddziaływanie: oddziaływanie słabe.



## Hipoteza Pauliego

Aby “uratować” zasadę zachowania energii Pauli zaproponował istnienie neutrina: dodatkowej cząstki unoszącej część energii w rozpadzie  $\beta$ :



Neutrino nie oddziałuje silnie (nie ma koloru), elektromagnetycznie (nie ma ładunku) ani grawitacyjnie (ma zaniedbywalną masę).

Aby opisać rozpad  $\beta$  (z udziałem neutrina) trzeba wprowadzić nowe, dodatkowe oddziaływanie: oddziaływanie słabe.

Na poziomie nukleonów rozpad  $\beta^-$  odpowiada przemianie:



rozpad ten zachodzi również dla swobodnego neutronu...

Teorię opisującą ten rozpad zaproponował w 1933 roku Enrico Fermi...

## Orbitalny moment pędu

Elektron krążący wokół jądra atomu ma związany z tym moment pędu.

Moment pędu jest tym dla ruchu obrotowego czym pęd dla ruchu postępowego. W układach izolowanych jest ściśle zachowany.

## Orbitalny moment pędu

Elektron krążący wokół jądra atomu ma związany z tym moment pędu.

Moment pędu jest tym dla ruchu obrotowego czym pęd dla ruchu postępowego. W układach izolowanych jest ściśle zachowany.

Krążący wokół jądra ładunek wytwarza też moment magnetyczny!

Tak jak pętla z drutu w której płynie prąd...

## Orbitalny moment pędu

Elektron krążący wokół jądra atomu ma związany z tym **moment pędu**.  
Moment pędu jest tym dla ruchu obrotowego czym pęd dla ruchu postępowego. W układach izolowanych jest ściśle zachowany.

Krążący wokół jądra ładunek wytwarza też **moment magnetyczny!**  
Tak jak pętla z drutu w której płynie prąd...

Jeśli atom/jądro/cząstka ma niezerowy **moment magnetyczny** to w silnym **polu magnetycznym** stara się ustawić momentem magnetycznym wzdłuż kierunku pola.

Ośrodek złożony z atomów o niezerowym momencie magnetycznym może ulec **polaryzacji** w **silnym polu magnetycznym**

Dla pojedynczej cząstki posiadającej moment magnetyczny, tor jej ruchu może być **zakrzywiany** w **niejednorodnym polu magnetycznym**  
⇒ w ten sposób możemy badać orientację momentu pędu cząstki

## Polaryzacja ośrodka - pokaz



## Spinowy moment pędu “spin”

W 1925 roku **Wolfgang Pauli** zapostulował, że **dwa elektrony** w atomie **nie mogą** być w stanie opisanym przez **ten sam zestaw liczb kwantowych**.

Jednocześnie jednak musiał wprowadzić dodatkową “wewnętrzną” liczbę kwantową dla elektronu, która mogła przyjmować tylko dwie wartości.

Jest to tzw. **Zakaz Pauliego**

konieczny do wytłumaczenia obserwowanych doświadczalnie **widm atomów**.  
Co najwyżej dwa elektrony w atomie obsadzają stan podstawowy!

Okazuje się, że zakaz Pauliego dotyczy wszystkich leptonów i kwarków.

## Spinowy moment pędu “spin”

W 1925 roku **Wolfgang Pauli** zapostulował, że **dwa elektrony** w atomie **nie mogą** być w stanie opisanym przez **ten sam zestaw liczb kwantowych**.

Jednocześnie jednak musiał wprowadzić dodatkową “wewnętrzną” liczbę kwantową dla elektronu, która mogła przyjmować tylko dwie wartości.

Wkrótce potem **George Uhlenbeck** i **Samuel Goudsmit**, doszedli do wniosku, że elektron ma swój własny moment pędu - spin.

Orientacja spinu elektronu stanowi właśnie dodatkową liczbę kwantową potrzebną, aby zakaz Pauliego dobrze opisywał atomy.

## Spinowy moment pędu “spin”

W 1925 roku **Wolfgang Pauli** zapostulował, że **dwa elektrony** w atomie **nie mogą** być w stanie opisanym przez **ten sam zestaw liczb kwantowych**.

Jednocześnie jednak musiał wprowadzić dodatkową “wewnętrzną” liczbę kwantową dla elektronu, która mogła przyjmować tylko dwie wartości.

Wkrótce potem **George Uhlenbeck** i **Samuel Goudsmit**, doszedli do wniosku, że elektron ma swój własny moment pędu - spin.

Orientacja spinu elektronu stanowi właśnie dodatkową liczbę kwantową potrzebną, aby zakaz Pauliego dobrze opisywał atomy.

Mechanika kwantowa przewiduje, że dla dowolnie wybranego kierunku  $Z$  rzut spinu  $s$  elektronu może przyjąć tylko dwie wartości:  $s_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$ .

⇒ dlatego mówimy, że elektron ma “**spin połówkowy**” (jest fermionem).



## Spinowy moment pędu “spin”

W 1925 roku **Wolfgang Pauli** zapostulował, że dwa elektrony w atomie nie mogą być w stanie opisanym przez ten sam zestaw liczb kwantowych.

Jednocześnie jednak musiał wprowadzić dodatkową “wewnętrzną” liczbę kwantową dla elektronu, która mogła przyjmować tylko dwie wartości.

Wkrótce potem **George Uhlenbeck** i **Samuel Goudsmit**, doszedli do wniosku, że elektron ma swój własny moment pędu - spin.

Orientacja spinu elektronu stanowi właśnie dodatkową liczbę kwantową potrzebną, aby zakaz Pauliego dobrze opisywał atomy.

Mechanika kwantowa przewiduje, że dla dowolnie wybranego kierunku  $Z$  rzut spinu  $s$  elektronu może przyjąć tylko dwie wartości:  $s_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$ .

⇒ dlatego mówimy, że elektron ma “spin połówkowy” (jest fermionem).

## Dwa rodzaje cząstek:

- cząstki materii - fermiony (cząstki o spinie  $\frac{1}{2}$ )
- nośniki oddziaływań - bozony (cząstki o spinie całkowitym)

## Spinowy moment pędu “spin”

W 1925 roku **Wolfgang Pauli** zapostulował, że **dwa elektrony** w atomie **nie mogą** być w stanie opisanym przez **ten sam zestaw liczb kwantowych**.

**Jednocześnie jednak** musiał wprowadzić dodatkową “wewnętrzną” liczbę kwantową dla elektronu, która mogła przyjmować tylko dwie wartości.

Wkrótce potem **George Uhlenbeck** i **Samuel Goudsmit**, doszedli do wniosku, że elektron ma swój własny moment pędu - spin.

**Orientacja spinu elektronu stanowi właśnie dodatkową liczbę kwantową potrzebną, aby zakaz Pauliego dobrze opisywał atomy.**

Mechanika kwantowa przewiduje, że dla dowolnie wybranego kierunku  $Z$  rzut spinu  $s$  elektronu może przyjąć tylko dwie wartości:  $s_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$ .


⇒ dlatego mówimy, że elektron ma “**spin połówkowy**” (jest fermionem).

W przypadku poruszającego się elektronu mówimy, że jest


- **prawoskrętny**, jeśli spin jest **zgodny** z kierunkiem pędu (rzut  $+\frac{1}{2}\hbar$ ),
- **lewoskrętny**, jeśli spin jest **przeciwny** do kierunku pędu (rzut  $-\frac{1}{2}\hbar$ ).

- 1 Oddziaływania podstawowe (przypomnienie)
- 2 Liczby kwantowe
- 3 Neutrina
- 4 Teoria Fermiego**
- 5 Model Weinberg'a-Salam'a

W 1933 roku **Enrico Fermi** zaproponował teorię **rozpadu  $\beta$** :



Na poziomie **nukleonów**:



Uniwersalne **sprężenie punktowe**  
 $\Rightarrow$  jeden wolny parametr:  $G_F$   
 (obecnie nazwany "stałą Fermiego")

Czas życia izotopu zależy jedynie od energii rozpadu  $E_0$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{G_F^2 E_0^5}{30 h \pi^3}$$

Stała Fermiego jest bardzo mała

$$G_F \approx 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$$

$\Rightarrow$  długie czasy życia

Teoria Fermiego zakładała na początku, że oddziaływania słabe mają taką samą strukturę jak oddziaływania elektromagnetyczne.

Model w tym kształcie przetrwał ponad 20 lat.

**Teoria Fermiego** zakładała na początku, że oddziaływania **słabe** mają taką samą strukturę jak oddziaływania **elektromagnetyczne**.

**Model w tym kształcie przetrwał ponad 20 lat.**

## **Doświadczenie Wu** 1957

Pani **C.S.Wu** zaobserwowała **łamanie parzystości** w rozpadzie



W niskiej temperaturze większość **jąderek kobaltu** ustawia się **spinem** wzdłuż kierunku pola magnetycznego.  $\Rightarrow$  Wu zaobserwowała **nadwyżkę** elektronów emitowanych w kierunku **przeciwnym do spinu jądra**.

**Teoria Fermiego** zakładała na początku, że oddziaływania **słabe** mają taką samą strukturę jak oddziaływania **elektromagnetyczne**.

**Model w tym kształcie przetrwał ponad 20 lat.**

## **Doświadczenie Wu** 1957

Pani **C.S.Wu** zaobserwowała **łamanie parzystości** w rozpadzie



W niskiej temperaturze większość **jąderek kobaltu** ustawia się **spinem** wzdłuż kierunku pola magnetycznego.  $\Rightarrow$  Wu zaobserwowała **nadwyżkę** elektronów emitowanych w kierunku **przeciwnym do spinu jądra**.

Aby wytłumaczyć wynik doświadczenia trzeba było przyjąć, że:

- produkowane elektrony są zawsze **“lewoskrętne”**  
(spin przeciwny do pędu)
- produkowane anty-neutrino są zawsze **“prawoskrętne”**  
(spin zgodny z pędem)

## Parzystość

Transformacja przystości (P):

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$

odwrócenie kierunku osi wszystkich współrzędnych przestrzennych.  
Jest to równoważne operacji odbicia względem płaszczyzny (“w lustrze”).



## Parzystość

Transformacja przystości (P):

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$


odwrócenie kierunku osi wszystkich współrzędnych przestrzennych.  
Jest to równoważne operacji odbicia względem płaszczyzny ("w lustrze").

Opis oddziaływań elektromagnetycznych **nie zmienia się** przy odbiciu  
(odwrócenie wszystkich współrzędnych przestrzennych)


Gdy obserwujemy w lustrze oddziaływania ładunków elektrycznych to zachodzą one według dokładnie tych samych praw, co w rzeczywistym (nie odbitym) świecie

⇒ Mówimy, że **oddziaływania EM zachowują przystość.**

## Parzystość - pokaz



## Parzystość - pokaz



## Łamanie parzystości

**Spin** cząstki nie zmienia się przy odbiciu (!) (tak jak moment pędu), ale zmienia się kierunek jej pędu  $\Rightarrow$  zmienia się skrętność cząstki:

- cząstka lewoskrętna zamienia się na prawoskrętną
- cząstka prawoskrętna zamienia się na lewoskrętną

## Łamanie parzystości

Spin cząstki nie zmienia się przy odbiciu (!) (tak jak moment pędu), ale zmienia się kierunek jej pędu  $\Rightarrow$  zmienia się skrętność cząstki:

- cząstka lewoskrętna zamienia się na prawoskrętną
- cząstka prawoskrętna zamienia się na lewoskrętną

Doświadczenie Wu:



Po odwróceniu współrzędnych (transformacja parzystości P):



Ale okazuje się, że takiej konfiguracji nie obserwujemy !

$\Rightarrow$  oddziaływania słabe łamią parzystość

Patrząc na przebieg pomiaru możemy stwierdzić, czy patrzymy “wprost”, czy na odbicie w lustrze...

## Łamanie parzystości - pokaz



## Sprężenie ładunkowe

Transformacja zamiany cząstki na anty-cząstkę (C).

Rozpad  $\pi^-$ :      wynik doświadczeń

$$\pi^- \rightarrow \mu_L^- + \bar{\nu}_{\mu,R}$$

## Sprzężenie ładunkowe

Transformacja zamiany cząstki na anty-cząstkę (C).

Rozpad  $\pi^-$ :           wynik doświadczeń

$$\pi^- \rightarrow \mu_L^- + \bar{\nu}_{\mu,R}$$

Po odwróceniu współrzędnych (P):

$$\pi^- \rightarrow \mu_R^- + \bar{\nu}_{\mu,L}$$

Po zamianie cząstek na antycząstki (C):

$$\pi^+ \rightarrow \mu_L^+ + \nu_{\mu,R}$$



## Sprężenie ładunkowe

Transformacja zamiany cząstki na anty-cząstkę (C).

Rozpad  $\pi^-$ :           wynik doświadczeń

$$\pi^- \rightarrow \mu_L^- + \bar{\nu}_{\mu,R}$$

Po odwróceniu współrzędnych (P):           Nie obserwujemy !

$$\pi^- \rightarrow \mu_R^- + \bar{\nu}_{\mu,L}$$

Po zamianie cząstek na antycząstki (C):           Nie obserwujemy !

$$\pi^+ \rightarrow \mu_L^+ + \nu_{\mu,R}$$

## Sprzężenie ładunkowe

Transformacja zamiany cząstki na anty-cząstkę (C).

Rozpad  $\pi^-$ :            **wynik doświadczeń**

$$\pi^- \rightarrow \mu_L^- + \bar{\nu}_{\mu,R}$$

Po odwróceniu współrzędnych (P):            **Nie obserwujemy !**

$$\pi^- \rightarrow \mu_R^- + \bar{\nu}_{\mu,L}$$

Po zamianie cząstek na antycząstki (C):            **Nie obserwujemy !**

$$\pi^+ \rightarrow \mu_L^+ + \nu_{\mu,R}$$

Złożenie obu transformacji (CP):            **Obserwujemy !!!**

$$\pi^+ \rightarrow \mu_R^+ + \nu_{\mu,L}$$

**Oddziaływania słabe zachowują CP !!!**

Podczas gdy zarówno C jak i P jest w oddz. słabych łamane

- 1 Oddziaływania podstawowe (przypomnienie)
- 2 Liczby kwantowe
- 3 Neutrina
- 4 Teoria Fermiego
- 5 Model Weinberg'a-Salam'a

## Nowy model oddziaływań słabych 1968


Weinberg i Salam zauważyli, że precyzyjny opis oddziaływań neutrin wymaga założenia, że zachodzą one przez wymianę **bardzo masywnego** bozonu  $W^\pm$

“Słabość” oddziaływania nie wynika ze stałej sprzężenia a z **dużej masy bozonu**:

$$G_F \sim \frac{g^2}{m_W^2}$$

Przyjmując, że **sprzężenie**  $g$  powinno być takie jak dla oddziaływań EM, Weinberg i Salam oszacowali masę  $m_W \sim 80 \text{ GeV}$ ...

Rozpad mionu:



## Nowy model oddziaływań słabych 1968

Weinberg i Salam zauważyli, że precyzyjny opis oddziaływań neutrin wymaga założenia, że zachodzą one przez wymianę **bardzo masywnego** bozonu  $W^\pm$


“Słabość” oddziaływania nie wynika ze stałej sprzężenia a z **dużej masy bozonu**:

$$G_F \sim \frac{g^2}{m_W^2}$$

Przyjmując, że **sprzężenie**  $g$  powinno być takie jak dla oddziaływań EM, Weinberg i Salam oszacowali masę  $m_W \sim 80 \text{ GeV}$ ...

Model przewidywał też istnienie **ciężkiego neutralnego bozonu**  $Z^0$ , którego masę oszacowali na  $m_Z \sim 90 \text{ GeV} \Rightarrow$  **nowy typ reakcji !!!**

Rozpad mionu:



## Potwierdzenie doświadczalne

W roku 1963 uruchomiona została pierwsza wiązka neutrin w CERN

⇒ początek precyzyjnych pomiarów oddziaływań neutrin

Do pomiarów tych oddziaływań zbudowano eksperyment **Gargamelle** komorę pęcherzykową o długości 4.8 m, około 12 m<sup>3</sup> freonu (CF<sub>3</sub>Br).


Oprócz reakcji oczekiwanych jako “odwrotne” procesy  $\beta$  (wymiana  $W^\pm$ )





zaobserwowano także procesy bez przekazu ładunku (tzw. prądy neutralne “**Neutral Currents**”; 1973):



⇒ potwierdzenie przewidywań modelu









## Duplety cząstek

Aby móc wytłumaczyć obserwowane reakcje zachodzące poprzez wymianę  $W^\pm$  należało dodatkowo założyć, że cząstki występują w dubletach:

$$\begin{array}{l} U \Rightarrow \\ D \Rightarrow \end{array} \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix} \quad Q_U = Q_D + 1e(!)$$

## Duplety cząstek

Aby móc wytłumaczyć obserwowane reakcje zachodzące poprzez wymianę  $W^\pm$  należało dodatkowo założyć, że cząstki występują w dubletach:

$$\begin{array}{l}
 U \Rightarrow \\
 D \Rightarrow
 \end{array}
 \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}
 \quad
 \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}
 \quad
 Q_U = Q_D + 1e(!)$$

Fermiony tworzące dublet mogą **przechodzić jeden w drugi** poprzez emisję (lub absorbcję)  $W^\pm$ . Przykładowo:

$$\begin{array}{ll}
 \mu^- \rightarrow \nu_\mu + W^- & \text{czyli } D \rightarrow U + W^- \\
 c \rightarrow s + W^+ & U \rightarrow D + W^+
 \end{array}$$

## Duplety cząstek

Aby móc wytłumaczyć obserwowane reakcje zachodzące poprzez wymianę  $W^\pm$  należało dodatkowo założyć, że cząstki występują w dubletach:

$$\begin{array}{l} U \Rightarrow \\ D \Rightarrow \end{array} \left( \begin{array}{c} \nu_e \\ e^- \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \nu_\mu \\ \mu^- \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \nu_\tau \\ \tau^- \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c} u \\ d \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} c \\ s \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} t \\ b \end{array} \right) \quad Q_U = Q_D + 1e(!)$$

Fermiony tworzące dublet mogą **przechodzić jeden w drugi** poprzez emisję (lub absorbcję)  $W^\pm$ . Przykładowo:

$$\begin{array}{ll} \mu^- \rightarrow \nu_\mu + W^- & \text{czyli } D \rightarrow U + W^- \\ c \rightarrow s + W^+ & U \rightarrow D + W^+ \end{array}$$

Możliwe są też reakcje “krecji” i “anihilacji”:

$$\begin{array}{ll} W^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu & \text{czyli } W^- \rightarrow D + \bar{U} \\ c + \bar{s} \rightarrow W^+ & U + \bar{D} \rightarrow W^+ \end{array}$$

Wszystkie te reakcje mogą też zachodzić w drugą stronę...

Oddziaływania zachodzące poprzez wymianę  $W^\pm$  nazywane są (historycznie) procesami z wymianą prądów naładowanych (Charged Current - CC).

Oddziaływania zachodzące poprzez **wymianę  $W^{\pm}$**  nazywane są (historycznie) procesami z **wymianą prądów naładowanych** (Charged Current - CC).

## **Oddziaływania z wymianą $Z^0$**

Historycznie nazywane procesami z **wymiana prądów neutralnych** (Neutral Current - NC).


Oddziaływania zachodzące poprzez wymianę  $W^\pm$  nazywane są (historycznie) procesami z wymianą prądów naładowanych (Charged Current - CC).

## Oddziaływania z wymianą $Z^0$

Historycznie nazywane procesami z wymiana prądów neutralnych (Neutral Current - NC).

Emisja lub absorbcja bozonu  $Z^0$  nie zmienia zapachu cząstki!  
Podobnie jak emisja/absorbcja fotonu w oddziaływaniach EM.

Nie są możliwe procesy typu:




Oddziaływania zachodzące poprzez **wymianę  $W^\pm$**  nazywane są (historycznie) procesami z **wymianą prądów naładowanych** (Charged Current - CC).

## **Oddziaływania z wymianą $Z^0$**

Historycznie nazywane procesami z **wymiana prądów neutralnych** (Neutral Current - NC).

**Emisja lub absorbcja bozonu  $Z^0$  nie zmienia zapachu cząstki!**  
Podobnie jak emisja/absorbcja fotonu w oddziaływaniach EM.

Nie są możliwe procesy typu:



Oddziaływaniom słabym, zarówno oddziaływaniom NC jak i CC, podlegają **WSZYSTKIE** cząstki materii (kwarki i leptony oraz ich antycząstki)!  
Są to jedyne oddziaływania w których biorą udział **neutrina!**

## Oddziaływania słabe

Są najłabsze, ale też z pewnością najbardziej skomplikowane z pośród wszystkich oddziaływań podstawowych:

- pośredniczą masywne nośniki  $W^\pm$  i  $Z^0$   
fotony i gluony są bezmasowe



## Oddziaływania słabe

Są najłabsze, ale też z pewnością najbardziej skomplikowane z pośród wszystkich oddziaływań podstawowych:

- pośredniczą masywne nośniki  $W^\pm$  i  $Z^0$   
fotony i gluony są bezmasowe
- mogą zmieniać zapach cząstki (w oddziaływaniach CC)  
w oddziaływaniach silnych i EM zapach jest zachowany

## Oddziaływania słabe

Są najłabsze, ale też z pewnością najbardziej skomplikowane z pośród wszystkich oddziaływań podstawowych:

- pośredniczą masywne nośniki  $W^\pm$  i  $Z^0$   
fotony i gluony są bezmasowe
- mogą zmieniać zapach cząstki (w oddziaływaniach CC)  
w oddziaływaniach silnych i EM zapach jest zachowany
- łamią symetrie parzystości: świat odbity wygląda “inaczej”  
parzystość zachowana w oddziaływaniach silnych i EM

## Oddziaływania słabe

Są najłabsze, ale też z pewnością najbardziej skomplikowane z pośród wszystkich oddziaływań podstawowych:

- pośredniczą masywne nośniki  $W^\pm$  i  $Z^0$   
fotony i gluony są bezmasowe
- mogą zmieniać zapach cząstki (w oddziaływaniach CC)  
w oddziaływaniach silnych i EM zapach jest zachowany
- łamią symetrie parzystości: świat odbity wygląda “inaczej”  
parzystość zachowana w oddziaływaniach silnych i EM
- łamią sprzężenie ładunkowe: antycząstki oddziałują inaczej niż cząstki  
oddziaływani silne i EM takie same

## Oddziaływania słabe

Są najłabsze, ale też z pewnością najbardziej skomplikowane z pośród wszystkich oddziaływań podstawowych:

- pośredniczą masywne nośniki  $W^\pm$  i  $Z^0$   
fotony i gluony są bezmasowe
- mogą zmieniać zapach cząstki (w oddziaływaniach CC)  
w oddziaływaniach silnych i EM zapach jest zachowany
- łamią symetrie parzystości: świat odbity wygląda “inaczej”  
parzystość zachowana w oddziaływaniach silnych i EM
- łamią sprzężenie ładunkowe: antycząstki oddziałują inaczej niż cząstki  
oddziaływani silne i EM takie same

Jeśli nawiążemy kontakt z kosmitami (za pośrednictwem fal radiowych), będziemy mogli sprawdzić, czy są zbudowani z materii czy z antymaterii...

## Oddziaływania słabe

Mogłoby się wydawać, że są jednocześnie najmniej dla nas istotne...


Wprost przeciwnie!

## Oddziaływania słabe


Mogłoby się wydawać, że są jednocześnie najmniej dla nas istotne...

Wprost przeciwnie!

Oddziaływania słabe są odpowiedzialne za przemiany termojądrowe w Słońcu. Proces spalania wodoru zaczyna się od procesu **p-p**:



deuter produkowany jest także w reakcji “**pep**”:




## Oddziaływania słabe


Mogłoby się wydawać, że są jednocześnie najmniej dla nas istotne...

Wprost przeciwnie!

Oddziaływania słabe są odpowiedzialne za przemiany termojądrowe w Słońcu. Proces spalania wodoru zaczyna się od procesu **p-p**:



deuter produkowany jest także w reakcji “**pep**”:



Ponieważ są to oddziaływania słabe to reakcje te zachodzą bardzo powoli! Słońce świeci od ok. 5 mld. lat, dzięki temu mogło rozwinąć się życie na Ziemi. Gdyby oddziaływania słabe były silniejsze, nie mielibyśmy szans...